

Godkänt
2022-09-28
Giltigt t.o.m
2025-09-28

Versionsnummer
5.0
Diarienummer

Översikt över aktuella rekommenderade smittskyddsåtgärder mot covid-19 i vård och omsorg

För kompletterande information till denna översikt, se övriga coviddokument som finns på Intra och Smittskydd och vårdhygien Dalarnas externa hemsida.

Skyddsutrustning/source control

Åtgärd	Gäller	Gäller personal	Gäller patient/besökare
Skyddsutrustning för personal vid starkt misstänkt/bekräftad covid-19	Andningsskydd och visir på rummet, som alltid god följsamhet till basala hygien- och klädregler	X	
Munskydd som source control	Vid patientnära arbete inom två meter, samt vid utbrott/utbrottsrisk - då kontinuerlig munskyddsanvändning	X	
Munskydd för besökare	Munskydd kan erbjudas		X
Munskydd vid sjukresa	Rekommenderas	X	X

Provtagning

Åtgärd	Gäller	Gäller personal	Gäller patient/besökare
Provtagning av patienter med symtom inom slutenvård/SÄBO/hemtjänst (i övrigt tas prov endast om läkare bedömer att det behövs). Provtagningsindikation	Ja, PCR Undantag för provtagning vid PCR-bekräftad genomgången covid-19 senaste tre månaderna (om inte stark misstanke på covid-19 föreligger, då tas prov ändå)		X
Provtagning av patienter utan symtom som läggs in på vårdavdelning	Nej		X
Provtagning av patienter utan symtom som ska till op/IVA/förlossning eller som ska skoperas via näsa eller mun	Nej		X
Provtagning av barn utan symtom som läggs in på sjukhus	Nej		X
Provtagning av patienter utan symtom som skrivs ut till kommunal vård och omsorg	Nej		X
Provtagning av personal med symtom	Ja, provtagning med PCR. Personal med symtom stannar hemma. Personal som har haft PCR-bekräftad covid-19 de senaste tre månaderna behöver inte ta prov, men stannar hemma tills allmänt förbättrad.	X	
Provtagning av personal utan symtom	Nej, inte generellt. Antigentestning kan dock initieras av Centrala smittspårningsenheten vid smittspårning/utbrott	X	
Provtagning av personal som är hushållskontakt eller exponerad på arbetet	Nej. Vårdpersonal ska dock vara observant på symtom. Får arbeta om asymtomatisk.	X	
Provtagning av exponerad patient utan symtom inom slutenvård eller särskilt boende för äldre, oavsett vaccinationsstatus	Nej. Informeras och uppmanas vara uppmärksam på symtom i 14 dagar från smittotillfället. Bör vårdas på enkelrum och i möjligaste mån hålla avstånd till andra patienter under 7 dagar efter exponeringen.		X

Övriga smittskyddsåtgärder

Åtgärd	Gäller	Gäller personal	Gäller patient/besökare
Sträva efter att hålla avstånd	Ja	X	
Vaccination	Rekommenderas ta erbjudna doser	X	X
Säkra besök	Ja, se Smittsäkra besök till anhöriga vid vårdinrättningar i Region Dalarna		X